

◎小耳症聽力檢查時間表（「◎」表示合適的施測年齡）

檢查項目 年紀	聽性腦幹聽力檢查 (ABR含骨導及氣導)	耳音傳射檢查(OAE)	行為觀察檢查(BOA)	遊戲聽力檢查(play audiometry)	視覺增強聽力檢查 (VRA)	鼓室圖聽力檢查 (Tympanometry)	純音聽力檢查(PTA)	語音聽力檢查(SRT)	鐮骨肌反射
0-1 歲新生兒	◎	◎	◎			◎			
1-3 歲	◎	◎	◎		◎	◎			◎
3-6 歲	◎	◎		◎	◎	◎			◎
學齡兒童	◎	◎		◎		◎	◎	◎	◎
成年患者	◎	◎				◎	◎	◎	◎
備註	適用於注意力不集中，配合度差的嬰幼兒。缺點是必須先予鎮靜劑，俟其睡著後才能作檢查。	聽力障礙較嚴重者不適用，需在安靜狀態下施測。	患者至少須五個月大。	幼兒必須能合作、注意力要集中。遊戲聽力檢查雖然敏感度及特異度均高，但需資深聽力師操作，結果才會可信。	瞭解患者聽力損失的程度與聽力圖形狀。六個月大以上的患者適用之，六個月以下以及具有視覺或發展障礙的孩子則不適用。	出生 48 小時即可施測，可偵測早期中耳炎。	可用來評估其「聽障程度」，並作為選配、調整助聽器時的依據。	作為選配助聽器預後效果的參考。	檢查聽小骨是否完好或其它病灶。